

<p>شماره (۲)</p> <p>الف : تماس تلفنی فوری توسط مراقب سلامت /بهورز: ✓ بیماران قطعی (تست مولکولی یا ریپید مثبت) ✓ موارد اعلام شده از درگاه ۴۰۳۰ و سایت salamat.gov.ir ب: تماس بر اساس برنامه مدون توسط کلیه اعضا: بهورز و مراقب سلامت اسامی افراد پرخطر را از سامانه سیب استخراج کرده و بخشی از آن را به نیروهای داوطلب جهت پیگیری تحویل دهد.</p>	<p>شماره (۱)</p> <p>✓ کلیه افراد بالای ۶۰ سال ✓ گروه های با خطر شدید: بیماری شدید قلبی و عروقی مانند نارسایی قلبی ، بیماری عروق کرونر ، کاردیو میوپاتی ، بدخیمی ها، نارسایی مزمن کلیوی ، COPD، چاقی (BMI بالای ۳۰) ، آنمی سیکل سل ، دیابت تیپ ۲ ✓ خطر متوسط: آسم (متوسط و شدید) ، CVA ، پرفشارخون ، بارداری، سیگار، مصرف کورتیکوئید استروئیدها و سایر داروهای ایمنوساپرسیو ✓ کم خطر : پیوند مغز استخوان، HIV، نقص ایمنی، کودکان، تالاسمی، بیماریهای کبدی، اختلالات نورولوژیک، بیماری مزمن ریوی، دیابت تیپ</p>
<p>شماره (۴)</p> <p>بر اساس بسته آموزشی و شامل: علائم هشدار بیماری، دستورات تغذیه ای ، ضد عفونی سطوح و سرویس بهداشتی، رعایت کردن شرایط قرنطینه ، آموزش پیشگیری از بیماری ، استفاده از وسایل حفاظتی ، خودداری از شرکت در تجمعات ، قرنطینه معکوس ، آموزش اعلام وضعیت سلامتی فرد بطور روزانه از طریق سایت Salamat.gov.ir</p>	<p>شماره (۳)</p> <p>بررسی نیازهای حمایتی و اعلام به کمیته محله جهت اعزام تیم حمایتی در صورت تشخیص شامل: -نیازهای خدماتی -نیازهای دارویی -نیازهای معیشتی -نیاز به مکانی جهت قرنطینه و جداسازی -نیاز به قرنطینه معکوس - نیاز به وسایل حفاظت شخصی ، کالاهای پزشکی</p>
<p>شماره (۶)</p> <p>- در صورت وجود علائم زیر بیمار توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان ارجاع داده شود: ✓ تنگی نفس (پیشرفت سریع علائم تنفسی :ارجاع سریع به بیمارستان) ✓ کاهش سطح هوشیاری - در صورت وجود علائم زیر با پزشک منتخب آنکال تماس گرفته و بعد از تأیید ایشان فرد را به بیمارستان ارجاع دهید: ✓ افت فشار خون (سیستول کمتر از ۹۰) ✓ SpO2 کمتر از ۹۰ ✓ ریت تنفسی بیشتر از ۲۴ (در بیماران بدون تب) ✓ بیمارانی که پس از درمان های حمایتی سرپایی دچار تداوم دهیدراسیون و عدم تحمل خوراکی شده اند. ✓ SpO2 بین ۹۰ و ۹۳ بر اساس شرایط بالینی</p>	<p>شماره (۵)</p> <p>موارد مشکوک یعنی: • بیماری که دارای علائم بالینی و ملاک اپیدمیولوژیک است: علائم بالینی: شروع ناگهانی تب و سرفه یا سه تا از علائمهای ضعف، خستگی مفرط سردرد، درد عضلانی، گلودرد، آبریزش بینی، تنگی نفس ، استفراغ /تهوع / اسهال و کاهش سطح هوشیاری ملاک اپیدمیولوژیک: اشتغال یا مسافرت به مناطقی که احتمال چرخش ویروس وجود دارند نظیر مراکز اقامتی، محل های پر ازدحام، همایش ها و مراسمات و... در طی ۱۰ روز اخیر • فرد با بیماری حاد تنفسی با شروع علائم که در ۱۰ روز گذشته نیاز به بستری داشته است</p>
<p>شماره (۷)</p> <p>نیاز به تزریقات / تشدید سرفه ها و یا بروز سرفه های خلط دار تداوم یا تشدید تب بیشتر از ۳۸.۵ درجه به مدت ۵ روز اسهال شدید که کم آبی آن با درمان خوراکی علائم دهیدراسیون برطرف نمی شود /کلیه گروه های پرخطر شدید و متوسط / سالمندان</p>	<p>مورد محتمل یعنی :</p> <p>• مورد مشکوکی که با تظاهرات رادیولوژیک که از نظر رادیولوژیست به شدت مطرح کننده بیماری کوید ۱۹ می باشد. • بیمار مشکوکی که در تماس با بیمار محتمل یا قطعی یا خوشه ای از بیمارانی باشد که حداقل یک مورد قطعی در بین آنها گزارش شده باشد • از دست دادن ناگهانی حس بویایی و چشایی • مرگ کوید ۱۹ که توجه دیگری ندارد</p>
<p>شماره (۸)</p> <p>✓ کلیه افراد با ریسک فاکتور و علامتدار ✓ کلیه افراد با ریسک فاکتور که در تماس با فرد مشکوک /محتمل یا قطعی بودند (علامت دار و بی علامت) ✓ کلیه افراد بدون ریسک فاکتور و علامت دار در بررسی افراد در تماس نزدیک با بیمار</p>	